

İMAL TARİHİ:  
SON KULLANMA TARİHİ:  
ŞARJ NUMARASI:  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI:

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı Organizma adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Biber (Sera)	İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)	90ml/100 L su	3 gün

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktarı su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.

#### KALİBRASYON


Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

**Biber (Sera) İki noktalı kırmızıörümcek**, Sebze bahçelerinde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir, bitkinin dip ve orta yapraklarında iki noktalı kırmızıörümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Yapraklar üzerindeki canlı iki noktalı kırmızıörümcekler büyüteç ile sayılıp not edilir. Toplam canlı iki noktalı kırmızıörümcek sayısı sayılan yaprak adedine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı iki noktalı kırmızıörümcek sayısı bulunur ve biberde ise 3 adet canlı iki noktalı kırmızıörümcek görüldüğünde ilaçlama yapılır.



12-01-2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

agrikem

## AGRIKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. RANGE KING YAĞDA DAĞILABİLEN (OD)

GRUP	6	AKARİŞİT (Kırmızıörümcek ilacı)
5 g/l Abamectin		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Göz teması:** Varsa ve çıkarması kolay ise kontak lensleri çıkarın. Maruz kalan gözü bol miktarda akan su ile yıkayın. Göz kapaklarını birbirinden ve göz yuvarından uzak tutup, zaman zaman alt ve üst göz kapaklarını elinizle çekip, açıp kapatarak, gözlerin tam olarak yıkanmasını sağlayın. Doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir ilaç uygulamayın.

**Cilt teması:** Ürünle bulaşmış giysileri çıkarın. Etkilenmiş cilt bölgesini su ve hafif bir sabunla yıkayın. Sıcak suyla durulayın. Hastalık etkisi veya tahriş olursa tıbbi yardım alın.

**Soluma:** Temiz havaya çıkınız. Solunumun zorlaşması halinde oksijen veriniz. Solunum durmuşsa suni solunum uygulayınız. Acilen tıbbi yardım alın.

**Yutma:** Kusturmaya zorlamayın. Yutulmuşsa, maruziyete uğramış kişinin bilinci yerindeyse ağzı su ile yıkayın.(gargara yaptırın) Tıbbi yardım alın, mümkünse ürünün etiketini gösterin.

#### ANTİDOTU, TEDAVİSİ VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL : 114

NET MİKTARI:  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI:  
İÇİNDEKİLER  
Abamectin, izobütanol

UYARI KELİMESİ  
Tehlike

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



#### ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar  
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir  
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.  
P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın  
P273 Çevreye salıverilmesinden kaçının  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  
P501 İçeriği/kabı onaylanmış atık toplama alanlarında bertaraf edin  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Ürün yanabilir özellikle olduğundan ateşten uzak tutunuz.
- Rüzgârlı havada uygulama yapmayınız.
- Bitki koruma ürünü mahsulün tamamını tarlaya püskürtünüz.

AGRIKEM

Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  
AOŞB 3. Kısım 35. Cad. No: 16 Döğemealtı/ANTALYA  
Tel: 0 242 502 13 00 Fax: 0242 502 53 00  
Kurumlar V.D.: 008 080 2642 Tic. Sic.No: 110144  
Mersis No: 0030800282200001

DURMUŞ DEMİRELİ  
Şirket Vekili

## DİRENÇ YÖNETİMİ

RANGE KING adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grubu 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisit / akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek RANGE KING'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup:6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

## KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile daha önceden denenmelidir. Alkali reaksiyonu ilaçlarla karışmaz. Bitki koruma ürünlerine karşı oluşacak mukavemet nedeniyle farklı bir etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılması icap eden durumlarda tavsiye edilmektedir.

**agrikem**

**AGRIKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ**

**SAN. VE TİC. A.Ş.**

**RANGE KING**

**YAĞDA DAĞILABİLEN (OD)**

GRUP	6	AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)
------	---	------------------------------------

5 g/l Abamectin

## DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz

## FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadığı eksiklikler neticesinde oluşabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmezler.

## RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ

**AGRIKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ**

**SAN. VE TİC. A.Ş.**

AOSB 3. Kısım mahallesi 35. Cad. Agrikem Apt. No:16  
Döşemelatı/ANTALYA

**ÜRETİM TESİSİ:**

AOSB 3. Kısım 35. Cadde No:16 Döşemelatı/ANTALYA

**AGRIKEM**

Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  
AOSB 3. Kısım 35. Cad. No: 16 Döşemelatı/ANTALYA  
Tel: 0 242 502 15 00 Faks: 0042 502 53 00  
Kurumlar V.D.: 078 000 0022 Tic Sic No: 110144  
Mersis No: 0930000222000901



**Durmuş DEMİREL**  
Şirket Vekili

f 39

12-01-2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

  
Umur Uğur BAĞCI  
Daire Başkanı

